

Tanaisie vulgaire

Tanacetum vulgare



Nom commun : Tanaisie vulgaire
Nom scientifique : *Tanacetum vulgare*
Famille : *Asteraceae*

Description

La tanaisie vulgaire est une plante vivace robuste très jolie. Elle peut atteindre 150 cm de hauteur et forme des ombelles de fleurs jaune vif en forme de boutons. La plante, légèrement toxique, dégage une forte odeur quand on froisse les feuilles. Elle pousse bien en plein soleil, habituellement dans des terrains perturbés, notamment le long des routes, sur les berges des cours d'eau et au bord des plages. Elle est considérée comme une mauvaise herbe nuisible dans certaines régions de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'État de Washington.



Photo : Andrea Altherr

Répartition au Yukon

Présente à Whitehorse, au lac Marsh, au lac Kathleen et le long des routes de l'Alaska et du Klondike et de la route Robert-Campbell. Elle gagne en popularité comme plante de jardin rustique.

Espèce semblable

La tanaisie du lac Huron ou tanaisie bipennée (*Tanacetum bipinnatum*) est une espèce indigène qui pousse le long de la rivière Porcupine et du tronçon du fleuve Yukon en aval de Dawson. Elle ne dépasse pas 60 cm de hauteur et ne forme que de 2 à 4 capitules.

Incidence écologique

Étant donné qu'elle pousse le long des fossés et des ruisseaux, elle peut gêner l'écoulement de l'eau. La plante est légèrement toxique pour les humains et le bétail.

Contrôle

Toutes les infestations signalées au Yukon étaient de taille modeste et ont pu être simplement arrachées. Il faut parfois creuser pour déraciner les plantes plus grosses. Les graines de la tanaisie vulgaire continuent de se développer même une fois la plante arrachée. Il faut donc mettre les plantes dans un sac à ordures transparent et les laisser au soleil pour qu'elles meurent et que les graines se dessèchent. Pour les populations plus étendues, il faudra peut-être utiliser un herbicide. Le port de vêtements protecteurs est recommandé pour éviter que ses toxines entrent en contact avec la peau.